

Is zwachtelen noodzakelijk om sneuvelen van een infuus te voorkomen	
Inleiding	<p>Infuuskatheters plaatsen kost tijd en vraagt om voldoende expertise van meestal een verpleegkundige, die niet altijd direct voor handen is. Kwetsbare of dunne bloedvaten, al dan niet veroorzaakt door chemotherapie, maken dat dit veelal een nog groter probleem is. Sneuvelen van een infuus kan meerdere oorzaken hebben. Denk hierbij aan optreden flebitis, - met bacteriëmie als ernstig potentieel gevolg-, subcutaan lopen van infusievloeistoffen en eventueel het blijven haken van infuusnaald waardoor deze niet meer in situ blijft. Regelmatig worden infuuskatheters 'gezwachteld' zoals te zien is op de titelpagina, met als doel het behoud van de infuusnaald. Dit staat echter niet in de standaard richtlijn voor infuusnaaldplaatsing beschreven. Wat zijn de overwegingen voor zwachtelen infuuskatheter en wat is de meerwaarde hiervan?</p>
Doel	<p>Meerwaarde aantonen dan wel uitsluiten van zwachtelen op behoud van infuuskatheters.</p>
Methode	<p>Studie van ziekenhuisbrede protocollen, literatuurstudie. Nadien verrichten voormeting met beide situaties. Nadien meerdere episoden waarbij structureel wel of niet wordt gezwachteld.</p>
Resultaten	<p>Door COVID uitbraak helaas onvoldoende tijd en ruimte gehad voor nameting. Echter tijdens voormeting al duidelijke aanwijzingen voor geen meerwaarde zwachtelen op behoud infuuskatheter.</p>
Discussie & Conclusie	<p>Er zijn aanwijzingen dat zwachtelen geen meerwaarde heeft op behoud infuuskatheter, meer onderzoek moet dit echter uitwijzen. Tevens mogelijk nadelige component op beoordelen insteekopening ter uitsluiting tromboflebitis. Mogelijk idee voor volgend meesterstuk?</p>